

کلونینگ و بیان ژن کاتکول ۲ و ۳ دی اکسیژناز استرپتومایسس خاکزی در باکتری اشرشیاکلی برای حذف آلاینده‌های نفتی

علی رضا فتحی پور^۱، مهدی نصیری نژاد^۱، سلاله سادات میرصیفی فرد^۲، سروناز فلسفی^۳، مجید صادق پور^۴، کیومرث امینی^{۵*}

^۱ دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی، گروه درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران
^۲ دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی، واحد علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
^۳ استادیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی، واحد علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
^۴ کارشناس ارشد میکروبیولوژی، عضو علمی انجمن میکروب شناسی ایران، تهران، ایران
^۵ دانشیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ اصلاح نهایی: ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۰/۰۸

چکیده

زمینه و هدف: استفاده گسترده از فرآورده‌های نفتی منجر به آلودگی محیط زیست شده و مشکلات جدی برای سلامت محیط ایجاد کرده‌اند. استرپتومایسس‌ها ۵۰٪ از کل جمعیت اکتینومیست‌های خاک را تشکیل داده که به فرم رشته‌ای، گرم مثبت و هوازی هستند. این باکتری‌ها به طور گسترده در محیط‌های طبیعی آبی و خشکی به وفور یافت می‌شوند، از نظر غذایی سخت گیر نبوده و تنها به منبع کربن و نیتروژن همراه با نمک‌های معدنی نیاز داشته و قادرند برای مدت‌های طولانی به صورت اسپور در خاک باقی بمانند. هدف از این مطالعه کلونینگ ژن کاتکول ۲، ۳-دی اکسیژناز ($C_{2,3}$) استرپتومایسس خاکزی در باکتری اشرشیاکلی به منظور حذف آلاینده‌های نفتی بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه ۵۸ نمونه از عمق ۵ تا ۱۰ سانتی خاک مناطق مختلف حاشیه نفتی شهر تهران و نواحی آلوده نفتی مثل انبار نفت و اطراف آن جمع آوری شد. پس از کشت، رقت‌سازی و انتخاب کلونی‌های مشکوک به استرپتومایسس جهت تعیین هویت، پس از تایید باکتری استرپتومایسس بر اساس خصوصیات ظاهری کلنی، میکروسکوپی و تست‌های بیوشیمیایی جهت تایید نهایی، شناسایی مولکولی، توالی 16srRNA آن‌ها تکثیر و مورد بررسی قرار گرفت. پس از استخراج DNA نمونه‌ها، برای تکثیر ژن $C_{2,3}$ از PCR استفاده شد. ژن $C_{2,3}$ به وسیله وکتور PTG19-T در باکتری اشرشیاکلی اورگانی کلون شد. در نهایت میزان بیان ژن هدف با روش Real Time PCR تعیین و پس از سکانس کردن درخت فیلوژنی رسم شد.

یافته‌ها: آنزیم کاتکول ۲ و ۳ دی اکسیژناز از منابع محدودی از جمله استرپتومایسس‌ها قابل استخراج است، با توجه به نیاز تکثیر ژن این آنزیم، از منابع باکتریایی تولید آن حائز اهمیت است. در نتیجه این مطالعه موفق به یافتن استرپتومایسس‌های بومی مولد آنزیم کاتکول ۲ و ۳ دی اکسیژناز گردید و در نهایت با موفقیت ژن آنزیم به باکتری اشرشیاکلی اورگانی وارد شد.

نتیجه گیری: در این مطالعه بدنبال ایجاد میزبان نوترکیب با قابلیت بالای بیان، می‌تواند گام بزرگ در مسیر افزایش تولید این آنزیم در صنعت محسوب شود. همچنین بررسی بیشتر برای پیدا کردن سویه‌های جدید تولید کننده آنزیم کاتکول ۲ و ۳ دی اکسیژناز می‌تواند منجر به یافتن روش نوین حذف آلاینده‌های نفتی در خاک گردد.

واژه‌های کلیدی: کاتکول ۲ و ۳ دی اکسیژناز، ژن $C_{2,3}$ ، استرپتومایسس، 16srRNA، کلونینگ، اشرشیاکلی اورگانی

علی رضا فتحی پور، مهدی نصیری نژاد، سلاله سادات میرصیفی فرد، سروناز فلسفی، مجید صادق پور، کیومرث امینی. کلونینگ و بیان ژن کاتکول ۲ و ۳ دی اکسیژناز استرپتومایسس خاکزی در باکتری اشرشیاکلی برای حذف آلاینده‌های نفتی. مجله طب دامپزشکی جایگزین. ۱۴۰۱؛ ۵(۱۵): ۸۸۱-۸۹۶

مقدمه

در بین هیدروکربن‌های آلیفاتیک تشکیل دهنده سوخت‌های فسیلی، آلکان‌ها بخش مهمی از آن‌ها می‌باشند. آزاد شدن این ترکیبات در محیط مشکلات جدی زیست محیطی ایجاد می‌کند و نیاز به روش‌های کارآمد برای تجزیه این ترکیبات به ویژه آنهایی که دارای زنجیره بلندتری هستند وجود دارد. مشکلات اکولوژیک که در نتیجه آلودگی‌های نفتی ایجاد می‌شوند نیاز به توسعه تکنولوژی‌های کارآمد جهت تصفیه این آلاینده‌ها را نشان می‌دهد (Li et al., 2013).

جهت حذف آلودگی‌های نفتی و پیامدهای ناشی از آن راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده است، در دهه‌های اخیر زیست‌پالایی به دلیل هزینه‌های کم و کارایی بالا نسبت به دیگر روش‌ها ارجحیت پیدا کرده است (Weinberg & Hanahan, 2000). در زیست‌پالایی کاتالیزورهای زیستی بر روی مواد آلاینده عمل کرده و آلاینده‌های موجود در آب، پساب، لجن، خاک و... را تغییر داده و یا از بین می‌برد و روشی عملی و اقتصادی جهت حذف بسیاری از آلاینده‌های زیست محیطی محسوب می‌شود (Masters et al., 2021).

شناسایی تعداد زیادی از باکتری‌ها با قابلیت تجزیه زیستی ترکیبات نفتی، منجر به توسعه زیست‌پالایی شده و این فناوری را تبدیل به روشی رایج و کارآمد در تصفیه مناطق آلوده کرده است. میکروارگانیزم‌های مختلفی از قبیل *Pseudomonas Rhodococcus sp*، *Streptomyces sp*، *Bacillus sp* و *Acinetobacter sp* قادر به تجزیه هیدروکربن‌های نفتی می‌باشند. اگر چه تاکنون شمار متعددی از باکتری‌های تجزیه‌کننده مواد نفتی جداسازی و شناسایی شده‌اند، استفاده از باکتری‌های بومی با توجه به سازگاری آن‌ها به محیط در اولویت قرار دارد (Cohen, 2013).

زیست‌پالایی فرآیندی پیچیده بوده و جهت رسیدن به بهترین نتیجه در زیست‌پالایی علاوه بر استفاده از

باکتری‌های کارآمد، دانستن شرایط محیطی بهینه نیز پر اهمیت می‌باشند. استریتومایسس یکی از این میکروارگانیزم‌هاست که با توجه به توانایی زیاد در استفاده از منابع مختلف کربن در حذف آلاینده‌های زیستی و حضور در بیشتر مکان‌ها مورد توجه خاصی قرار گرفته است. امروزه از این باکتری‌ها در مهندسی ژنتیک استفاده می‌شود و نقش بسیار مهمی در فعالیت‌های متابولیکی محیط زیست مانند چرخه عناصر و تجزیه آلاینده‌های ناشی از فعالیت‌های زیستی و غیر زیستی بازی می‌کند (Glick & Patten, 2017).

اکتینومیست‌ها رشته‌ای ترین باکتری‌ها هستند که اساساً هوازی بوده اما بعضی جنس‌های آن بی‌هوازی اختیاری یا اجباری‌اند و از اکوسیستم‌های زمینی و دریایی جداسازی می‌شوند. استریتومایسس‌ها از خانواده اکتینومیست‌ها، گرم مثبت و هوازی هستند که از خاک، آب، رسوبات و منابع مختلف جدا می‌شوند اما جایگاه طبیعی اکثر استریتومایسس‌ها خاک است و حدود ۱ تا ۲۰ درصد جمعیت قابل کشت را تشکیل می‌دهند استریتومایسس‌ها به دلیل توانایی تولید و سنتز آنتی‌بیوتیک بسیار معروف می‌باشند. این باکتری‌ها در حدود ۷۵٪ از آنتی‌بیوتیک‌های مفید پزشکی و تجاری را تولید می‌کنند و تقریباً ۶۰٪ از آنتی‌بیوتیک‌هایی که در کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند از گونه‌های استریتومایسس جدا شده‌اند (Watson et al., 2007).

استریتومایسس‌ها به دلیل نقش منحصر به فرد خود در توانایی تولید متابولیت‌های ثانویه و مواد فعال بیولوژیکی از جمله نگهدارنده‌ها و آنزیم‌ها، یکی از عوامل حائز اهمیت در ارتقا صنعت تولید غذا و دارو محسوب می‌شوند. توانایی میکروارگانیزم‌ها در تولید بیوسورفکتانت‌ها سبب شده است که میکروارگانیزم‌های متنوعی در تولید بیوسورفکتانت‌ها مورد توجه قرار گیرند. کاتکول ۲ و ۳ دی‌اکسیژناز آنزیمی است که تجزیه حلقه آروماتیک را کاتالیز می‌کند. ژن ساختاری این آنزیم در یک قطعه ۵-۳

Sánchez-Suárez *et al.*,) را می‌دهد (muconate 2020). در ایران مطالعاتی در این زمینه انجام نشده است و در نتیجه هدف این مطالعه جداسازی و کلونینگ ژن کاتکول (C_{2,3}) از گونه‌های استریتومایسس و کلونینگ آن در باکتری اشرشیاکلی به منظور حذف آلاینده‌های نفتی می‌باشد.

مواد و روش‌ها

غربالگری نمونه‌های خاک و جداسازی استریتومایسس‌ها

نمونه برداری خاک در فصول سرد و گرم سال (از ابتدا تا انتهای سال ۱۳۹۹) از مناطق مختلف حاشیه نفتی شهر تهران و نواحی آلوده نفتی مثل انبار نفت و اطراف آن انجام گرفته و آنها جمع‌آوری شد. به این ترتیب که ۵۸ نمونه از عمق ۵ تا ۱۰ سانتی متری خاک جمع‌آوری شده و بعد از بسته بندی در کیسه‌های پلاستیکی استریل، به آزمایشگاه ارسال شدند. سپس به منظور جداسازی و شناسایی اولیه میکروارگانیسم‌های دارای فعالیت پروتئولیتیک از محیط کشت *Skim milk agar* و آزمون‌های بیوشیمیایی استفاده شد (Mahon *et al.*, 2018).

در خصوص کشت نمونه‌های خاک به منظور کاهش تعداد فرم‌های رویشی با هدف جداسازی سویه‌های استریتومایسس از دو تیمار مختلف شامل تیمار حرارتی، خشک کرده خاک استفاده شد و سپس رقت سازی به روش سریال دایلوژن از نمونه های خاک در آب مقطر، انجام شد. در شناسایی مولکولی ایزوله مورد بحث در این تحقیق، آنالیز داده های حاصل از بررسی توالی قطعه مربوط به ژن *16srDNA* حاکی از تطابق منطقی آن با توالی ژن مذکور در باکتری‌های استریتومایسس بود. این نتیجه در تائید مشاهدات مربوط به خصوصیات مورفولوژیکی کلونی، اثبات کرد که باکتری که از خاک مناطق مختلف حاشیه شهر تهران و باغ‌های اطراف آن جداسازی شده است، به جنس استریتومایسس تعلق دارد.

کیلونوکلوتید محدودکننده BglII پلاسمید pTC1 قرار دارد (Nathans & Ho, 1975).

کاتکول ترکیب ارگانیک با فرمول مولکولی C₆H₄(OH)₂ است. این ماده ایزومر ارتو سه بنزنولیول ایزومریک، ترکیب بی‌رنگ و به طور طبیعی در مقادیر کم یافت می‌شود (Primrose & Twyman, 2013). همسانه سازی، کلون‌سازی ژن یا کلونینگ مولکولی به طور عام به معنای جدا کردن یک توالی از ژنوم یک موجود و قرار دادن آن در ژنوم یا مولکول DNA موجود دیگر است. به مولکول DNA نو ترکیب حاصل از کلون‌سازی که حاوی ژن‌های بیگانه است، کلون نام دارد (Weinberg & Hanahan, 2000).

استریتومایسس‌ها قادر به تولید بیش از یک نوع آنتی‌بیوتیک بوده و ممکن است از نظر شیمیایی در یک خانواده نباشند. تولیدات استریتومایسس‌ها، در کشاورزی، تولید فرآورده‌های صنعتی و درمان بیماری‌های انسان و دام کاربرد دارند. تنوع در مکانیسم فعالیت آنتی‌بیوتیک‌های تولید شده توسط استریتومایسس‌ها موجب گردیده تا این گروه از باکتری‌ها در زمینه تولید آنتی‌بیوتیک مورد توجه باشند. از سوی دیگر جستجو در میان متابولیت‌های ثانویه استریتومایسس‌ها جهت دستیابی به انواع جدید آنتی‌بیوتیک، همچنان ادامه دارد (Primrose & Twyman, 2013).

کاتکول دی‌اکسیژنازاها شکست اکسیداتیو کاتکول و کاتکول‌های استخلاف شده را کاتالیز می‌کنند که به عنوان یک مرحله کلیدی در تجزیه باکتریایی ترکیبات آروماتیک در محیط محسوب می‌شود. این آنزیم‌ها زمانی القاء می‌شوند که تنها منبع کربن در دسترس باکتری، مولکول‌های آروماتیک است. آنزیم‌های دی‌اکسیژناز توسط Hayaishi کشف شد که شکست اکسیداتیو کاتکول را کاتالیز کنند و دی‌اکسیژنازهای اینترادیول که عضو بارز آنها کاتکول ۱ و ۲ دی‌اکسیژناز (پیروکاتکاز Pyrocatechase) است، پیوند کربن-کربن میان گروه‌های هیدروکسیل فنل را می‌شکند و تشکیل فرآورده‌ای به نام سیس-سیس موکونات (cis, cis-

محیط کشت‌های مصرفی

محیط کشت‌های استفاده شده در تحقیق شامل موارد زیر است: مولر هینتون براث، مولر هینتون آگار، نوترینت براث، تریپتیک سوی براث، پلیت کانت آگار، تریپتیک سوی آگار، استارچ کازئین آگار که تولید شرکت مرک-کشور آلمان استفاده شد.

کشت نمونه‌های خاک

برای نمونه برداری از خاک به نکات مهمی توجه شد. در خصوص کشت نمونه‌های خاک به منظور کاهش تعداد فرم‌های رویشی با هدف جداسازی سویه‌های استریتومایسس از دو تیمار مختلف شامل تیمار حرارتی، خشک کرده خاک استفاده شد. سپس رقت سازی به روش سریال دایلوژن از نمونه‌های خاک در آب مقطر، انجام شد (Indira, 2014). پس از نمونه برداری، نمونه‌های خاک در یک سطل جمع آوری و کاملاً مخلوط شد و مواد درشت مثل سنگ‌ها و ریشه‌ها حذف گردید. برای بررسی خصوصیات بیولوژیک، حداقل ۵۰۰ گرم از خاک منطقه مدنظر نمونه برداری شد.

انتقال رقت‌های خاک به محیط کشت

از کلیه رقت‌های تهیه شده برای هر نمونه خاک به میزان ۲ میلی‌لیتر در سطح محیط تریپتیک سوی آگار ریخته شد و به طور یکنواخت در تمام سطح محیط پخش و در شرایط هوازی، در دمای ۳۰ درجه سلسیوس به مدت ۷۲ ساعت انکوبه شد. سپس از لحاظ رشد و عدم رشد و کلنی‌های مشکوک به استریتومایسس مورد بررسی قرار گرفت (Montazer et al., 2020).

انتخاب کلونی‌های مورد نظر جهت به دست آوردن استریتومایسس

کلنی‌های رشد کرده در سطح محیط تریپتیک سوی آگار که با کلنی‌های استریتومایسس تهیه شده از نظر بانک میکروبی شباهت ظاهری داشتند توسط آنس سوزنی کشت برداشته و در سطح جدید تریپتیک سوی آگار که قبلاً در پلیت ریخته و

سطح آن‌ها خشک شده کشت خطی داده شد و در دمای ۳۰ درجه سلسیوس، در شرایط هوازی به مدت ۷۲ ساعت انکوبه شد و از لحاظ خلوص بررسی گردیدند. باکتری استریتومایسس از طریق تست‌های بیوشیمیایی و بر اساس مورفولوژی ماکروسکوپی، میکروسکوپی و رشد در محیط‌های اختصاصی باسیل به دست آمد (Montazer et al., 2020).

تعیین هویت جدایه‌های باکتریایی مشکوک به استریتومایسس

پس از زمان رشد باکتری‌ها در سطح محیط کشت، کلونی‌های متفاوتی به دست آمد. کلونی‌های استریتومایسس با ظاهر گچی و بویی شبیه بوی خاک قابل تمیز می‌باشند. برای به دست آوردن کلونی‌های تک، با استفاده از یک لوپ، کلونی باکتری‌ها جدا و در پلیت‌های حاوی محیط کشت استارچ کازئین آگار کشت داده شد. این پلیت‌ها به مدت ۷-۵ روز در دمای ۲۸ درجه سلسیوس انکوبه شدند. پس از گذشت مدت زمان لازم برای رشد باکتری‌ها، ویژگی کلونی‌ها از قبیل رنگ سطح و پشت کلونی، سفتی و نرمی و چگونگی حاشیه آنها ثبت و نگهداری شدند (Mahon et al., 2018).

شناسایی مولکولی جدایه‌های استریتومایسس

پس از تایید باکتری استریتومایسس بر اساس خصوصیات ظاهری کلنی، خصوصیات میکروسکوپی و تست‌های بیوشیمیایی جهت تایید نهایی شناسایی مولکولی نیز انجام گردید. علاوه بر شناسایی جنس باکتری‌ها از طریق روش‌های ذکر شده، استفاده از شناسایی توالی حفاظت شده ژن $I6srRNA$ باکتری‌ها روش نوینی است که می‌توان از آن برای شناسایی جنس باکتری استفاده کرد. طول این گونه‌های استریتومایسس تعیین توالی شده حدود ۱۵۰۰bp است که حاوی درصد بالای GC است.

واکنش زنجیره ای پلی‌مراز (PCR)

برای تایید نهایی سویه استریتومایسس از پرایمرهای عمومی زیر استفاده گردید (جدول ۱). سپس محصول واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز (PCR) به منظور سکانس برای شرکت Bioneer کشور کره جنوبی ارسال گردید و نتیجه سکانس در دیتابیس NCBI، BLAST شد.

برنامه دمایی PCR

ترکیب DNA تخلیص شده با حجم مورد نیاز واکنش در یک میکروتیوپ و انتقال میکروتیوپ‌ها به دستگاه ترموسایکر

براساس برنامه سیکل حرارتی: واسرشت اولیه در ۹۵ درجه سانتی گراد به مدت ۵ دقیقه، ۳۵ سیکل هرکدام شامل: واسرشت در ۹۴ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ ثانیه، اتصال در ۵۵ درجه سانتی گراد به مدت ۴۵ ثانیه، مرحله بسط در ۷۲ درجه سانتی گراد به مدت ۱ دقیقه و نیز بسط نهایی در ۷۲ درجه سانتی گراد به مدت ۱۰ دقیقه انجام شد (جدول ۲). محصولات PCR در ژل آگارز ۱/۵ درصد الکتروفورز شدند و با اتیدیوم بروماید رنگ آمیزی و تحت نور UV مشاهده و مستند سازی شدند.

نام ژن	توالی اولیگونوکلئوتیدی پرایمر (۵'→۳')	اندازه طول قطعه (bp)
16s	F= 5'AGAGTTTGATCMTGGCTCAG3'	۲۳۸
	R= 5'GGTTACCTTGTTACGACTTCACCC3'	

جدول ۱. پرایمرهای 16SrRNA مورد استفاده تایید نهایی سویه استریتومایسس

مرحله	دما (درجه سلسیوس)	زمان (ثانیه)	تعداد سیکل
واسرشت اولیه	۹۵	۳۰۰	۱
واسرشت	۹۴	۳۰	-
اتصال	۵۵	۴۵	-
بازآرایی (گسترش)	۷۲	۶۰	۳۰
بازآرایی نهایی	۷۲	۶۰۰	-

جدول ۲. برنامه دمایی مخلوط واکنش PCR برای ژن *16srDNA* باکتری استریتومایسس.

آماده سازی پرایمرها

جهت انجام PCR، در مرحله اول با توجه به سکانس ژن آنزیم کاتکول ۲ و ۳ دی اکسیژناز که از سایت NCBI (<http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>) گرفته شد و توسط برنامه Gene Runner، پرایمرهای هر ژن طراحی، مقایسه و BLAST گردید، سپس این پرایمرها

جهت سنتز به شرکت ماکروژن - ایران سفارش داده شد. پس از آن، پرایمرها توسط آب مقطر دیونیزه به غلظت ۱۰۰ پیکومول و سپس به غلظت مناسب که ۱۰ پیکومول بود، رسانده شدند. در جدول (۳) توالی پرایمر و طول قطعه تکثیری آورده شده است.

نام ژن	توالی اولیگونوکلئوتیدی پرایمر (۵'→۳')	اندازه طول قطعه (bp)
$C_{2,3}cat1$	F=CGACCTGATCTCCATGACCGA	۲۳۸
	R=TCAGGTCAGCACGGTCA	

جدول ۳. پرایمر مورد استفاده در این پژوهش.

نام ژن	مواد	حجم مورد نظر
C _{2,3cat1}	Distilled Water	μl۴
	Master mix	μl۱۰
	Forward each Primer(10 pimol)	μl۱
	Reverse each Primer(10 pimol)	μl۱
	DNA Streptomyces	μl۴
	Total volume	μl۲۰

جدول ۴. مخلوط واکنش PCR برای ژن C_{2,3}.

مقادیر PCR

مقادیر مواد PCR برای هر واکنش شامل ۱۰ میکرولیتر PCR Master Mix 2x، ۱ میکرولیتر از هر کدام یک از پرایمرها با غلظت ۱۰ پیکومول بر میکرولیتر، ۴ میکرولیتر از DNA الگو (۱۵۰ نانوگرم) و ۴ میکرولیتر آب مقطر بود (جدول ۴).

تعیین گونه استریتومایسس

برای تعیین هویت نهایی جنس استریتومایسس، با استفاده از فراوان سازی ژن‌های *16srRNA* برای تایید نهایی سویه استریتومایسس از پرایمرهای *16srRNA* (جدول ۱) استفاده گردید. سپس محصول PCR به منظور سکانس برای شرکت Bioneer کره ارسال گردید و نتیجه سکانس در دیتابیس NCBI، BLAST شد.

کلون کردن ژن C_{2,3} در باکتری اشریشیا کلی اوریکامی

درحالی که PCR به عنوان روشی برای تولید مقادیر بالا یک قطعه دلخواه جایگزین کلونینگ شده است، اما در موارد خاص کلونینگ DNA تکثیر شده به وسیله PCR ضروری است. به عنوان مثال تکنیک‌های معینی همانند سنتز پروتئین در *in vitro* با وارد سازی قطعه DNA به داخل یک وکتور پلاسمیدی یا فاژی مناسب بهتر به دست می‌آید. روش‌های کلونینگ برای محصولات PCR به طور تقریبی اجازه کلونینگ قطعات DNA به دست آمده از دستکاری‌های متداول DNA را هم به صورت انتهای صاف و هم چسبیده فراهم می‌نماید. DNA پلی‌مرازهای مقاوم به حرارت همانند TaqDNA منجر می‌شوند که محصولات PCR در انتهای

۳' خود یک باقی‌مانده آدنین تنها را دارا باشند (Asiabadi *et al.*, 2014).

استفاده از تکنیک TA-Cloning

به منظور کلونینگ سریع تر و موثرتر محصول PCR از روش TA-Cloning استفاده شد که کیت PCR TA-Cloning از شرکت سیناژن-ایران تهیه گردید. در این روش از یک وکتور خطی به نام PTG19-T که در انتهای ۳' آن باز تیمین قرار دارد، استفاده گردید. استفاده از وکتور خطی PTG19-T که در انتهای ۳' خود دارای باز تیمین است، منجر به اتصال مستقیم و سریع و آسان محصول PCR به وکتور کلونینگ می‌گردد، سپس آنزیم T4 DNA ligase با تشکیل پیوند کووالان اتصال DNA مورد نظر به وکتور خطی را محکم می‌کند، در نتیجه یک مولکول حلقوی که حاوی ژن مورد نظر تشکیل شده که توانایی تکثیر خود به خود را در میزبان مناسب مانند اشریشیا کلی اوریکامی دارا می‌باشد. در این روش نیاز به مرحله هضم آنزیمی نمی‌باشد و این مرحله حذف شده است (Asiabadi *et al.*, 2014).

غربال‌گری سفید/آبی به منظور تایید صحت کلونینگ

وکتور کلونینگ به کاررفته در این روش PTG19-T دارای ژن *LacZ* است، چون MCS وسط *LacZ* قرار گرفته و اگر قطعه‌ای وارد وکتور شود ژن *LacZ* تخریب می‌شود. در محیط کشت X-gal که آنالوگ لاکتوز است و IPTG که القاگر پروموتور *LacZ* وجود دارد، در نتیجه آنزیم پروتئاز باکتری فعال بوده و از X-gal استفاده کرده و کلنی آبی تشکیل می‌شود. اگر ژن مورد نظر ما وارد وکتور شده باشد، ژن *LacZ* تخریب شده و آنزیم غیرفعال شده است، در نتیجه باکتری

فیلولوژنتیکی ترسیم شدند. درخت‌های تهیه شده با استفاده از روش الحاق ترسیم MEGA 5.10 برنامه در Neighbor Joining همسانه گردید. به منظور ترسیم هیستوگرام مربوط به نمایش نمودار فواصل درون گونه‌ای پس از تعیین فواصل نوکلوتیدی به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار Excel، نمودار مربوطه رسم شد.

یافته‌ها

در مطالعه حاضر، نمونه برداری خاک از مناطق مختلف حاشیه نفتی شهر تهران و نواحی آلوده نفتی مثل انبار نفت و اطراف آن انجام شد. به این ترتیب که ۵۸ نمونه از عمق ۵ تا ۱۰ سانتی متری خاک جمع آوری شده و بر اساس آزمون‌های مولکولی، تا سطح جنس و گونه شناسایی گردید. در این بین ۱۲ نمونه به عنوان *استریپتومایسس* شناسایی شد و سپس جدایه‌هایی که دارای ژن $C_{2,3}$ بودند با استفاده از *16SrRNA* تعیین توالی شدند. بررسی مولکولی نشان داد، که این جدایه‌ها منسوب به گونه *استریپتومایسس* است.

بررسی میکروسکوپی نمونه‌های خاک به منظور جداسازی *استریپتومایسس*

در نتیجه غربال گری ۵۸ نمونه خاک ارسالی به آزمایشگاه در مجموع ۱۲ کلنی مشکوک به *استریپتومایسس* های رشته‌ای گرم مثبت جداسازی شده، که بر اساس خصوصیات مورفولوژیک، میکروسکوپی و تست‌های بیوشیمیایی تحت عنوان *استریپتومایسس* تعیین هویت شدند.

تعیین هویت بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی و میکروسکوپی

کلونی جدایه‌های مشکوک به *استریپتومایسس* در مقایسه با کلنی *استریپتومایسس* گرفته شده از بانک میکروبی و همچنین زیر میکروسکوپ مورد ارزیابی قرار گرفت و این نتایج بیانگر صحت وجود جدایه‌ها در خاک‌های جمع آوری شده می باشد.

نتوانسته از X-gal استفاده کند و کلنی‌های سفید در محیط کشت تشکیل می‌شود. در نتیجه تشکیل کلنی‌های سفید نشان دهنده این است که ژن مورد نظر ما با موفقیت کلون شده است. به علاوه چون محیط دارای آمپی سیلین است، کلنی‌هایی که می‌توانند در محیط رشد کنند در واقع نشان دهنده دریافت پلاسمید حاوی ژن مقاومت به آمپی سیلین هستند (*Asiabadi et al., 2014*).

انجام *Real-Time-PCR*

Real-Time-PCR در حجم ۲۰ میکرولیتر با استفاده از کیت به این صورت انجام شد که در ابتدا ۱۰ میکرولیتر از Prime Qmaster mix (2x) with syber green و سپس ۵ میکرولیتر از Depc water، یک میکرولیتر از پرایمرهای Forward و Reverse، یک میکرولیتر از Rox dye و ۲ میکرولیتر از cDNA استفاده شد. تکثیر قطعه‌های مورد نظر در دستگاه Corbet با برنامه دنا تورا سیون اولیه ۹۵ درجه سیلسیوس برای ۱ دقیقه، تکثیر شامل ۹۵ درجه سیلسیوس برای ۳۰ ثانیه، ۵۹ درجه سیلسیوس برای مدت ۴۰ ثانیه و ۷۲ درجه سیلسیوس برای ۶۰ ثانیه در ۳۵ چرخه انجام شد. از ژن *16srRNA* به عنوان کنترل داخلی تست استفاده شد (*Montazer et al., 2019*).


رسم درخت فیلولوژی

تجزیه تحلیل نتایج حاصل از توالی‌یابی توالی‌های به دست آمده توسط نرم افزار BioEdit بررسی گردید. بعد از اطمینان از صحت توالی‌های به دست آمده از دو رشته توالی یابی شده مستقیم و معکوس توسط نرم افزار DNA Baser رشته واحدی (از ۵' به ۳') مرتب شد. توالی‌های حاصله با جدایه‌های ثبت شده در NCBI مقایسه شدند. هر توالی به طور جداگانه توسط نرم افزار nBlast در بانک ژن جستجو شد و توالی‌های حاصل از Blast توسط نرم افزار W Clustal هم ردیف شدند. آنالیز فیلولوژنتیکی پس از هم‌ردیف نمودن توالی‌ها توسط نرم‌افزار W Clustal، با استفاده از برنامه‌های MEGA 5.10 درخت‌های

تعیین هویت جدایه‌های باکتریایی مشکوک به استریپتومایسس

همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد تعیین هویت بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی، میکروسکوپی، تست‌های بیوشیمیایی و مولکولی انجام شد. در جهت تأیید مشاهدات

مورفولوژیکی و برای حصول اطمینان از استریپتومایسس بودن ایزوله‌ها، توالی $16srRNA$ آنها تکثیر و مورد بررسی قرار گرفت (شکل ۱).




شکل ۱. نتیجه سکانس و بلاست جهت تعیین هویت مولکولی گونه استریپتومایسس.

نتیجه تأیید استخراج DNA

پس از استخراج DNA نمونه مورد نظر بر روی ژل آگارز ۱/۵٪ بارگذاری شده و نتیجه در شکل ۲ قابل مشاهده می‌باشد.

واکنش PCR برای ژن $C_{2,3}$ با پرایمرهای ذکر شده انجام شد. نتایج حاصل در شکل ۳ آورده شده است. از ۱۲ سویه استریپتومایسس جدا شده ۳ سویه واجد ژن $C_{2,3}$ بود.

نتیجه آزمون PCR به منظور شناسایی و کلون ژن $C_{2,3}$




شکل ۲. نتیجه تأیید استخراج DNA پس از انجام تست PCR.

تعیین هویت مولکولی جنس استریپتومایسس


به منظور تعیین هویت مولکولی جنس استریپتومایسس حامل ژن $C_{2,3}$ از پرایمرهای عمومی $16srRNA$ استفاده شد (شکل ۴).

نتیجه آزمون PCR به منظور شناسایی و کلون ژن $C_{2,3}$

واکنش PCR برای ژن $C_{2,3}$ با پرایمرهای ذکر شده انجام شد. نتایج حاصل در شکل ۳ آورده شده است. از ۱۲ سویه استریپتومایسس جدا شده ۳ سویه واجد ژن $C_{2,3}$ بود.



شکل ۳. نتیجه آزمون PCR برای بررسی فراوانی ژن $C_{2,3}$.



شکل ۴. نتیجه آزمون PCR با پرایمرهای عمومی $16S$ به منظور تعیین هویت مولکولی جنس استرپتومایسس.


به منظور تایید نتایج کلون، DNA از کلنی‌های مشکوک استخراج شده و توسط آزمون PCR و در نهایت با سکانس محصول PCR، ورود ژن $C_{2,3}$ به باکتری اشرشیاکلی اورینگامی تایید شد و در نهایت محصول PCR برای سکانس به شرکت Bioneer ارسال گردید و BLAST شد (شکل ۶ و ۷).

تولید کلون‌های نو ترکیب در T-A Cloning


نتایج حاصل از کلونینگ ژن $C_{2,3}$

پس از کلون کردن سویه حامل ژن $C_{2,3}$ توسط کلنی سلکشن (آبی/سفید) سویه‌های کلون شده جداسازی شدند (شکل ۵).


تایید نتایج کلون به وسیله PCR و سکانس



شکل ۵. نتایج کلون ژن $C_{2,3}$.



شکل ۶. تایید کلونینگ توسط سکانس با پرایمرهای M13 و کتور.



شکل ۷. تایید کلونینگ توسط PCR با پرایمرهای M13.

نتیجه تایید تست استخراج RNA و نتایج حاصل از Real Time PCR را در شکل ۸ قابل مشاهده است.

نتایج رسم درخت فیلوژنی


برای رسم درخت فیلوژنی از نرم افزار clustalX و Mega5 استفاده شد. در این مرحله از روش neighbor joining برای رسم درخت استفاده شد. بررسی درخت فیلوژنی گونه‌های مورد مطالعه و مقایسه با گونه‌های مشابه در بخشی از تحقیق حاضر، روابط فیلوژنتیکی بین گونه‌های استریتومایسس با استفاده از ژن $I6srRNA$ مورد بررسی

تایید نتایج کلون به وسیله Real time PCR و سکانس


به منظور تایید نتایج کلونینگ RNA کلنی های مشکوک استخراج شده و cDNA ساخته شد و توسط آزمون Real time PCR میزان بیان ژن $C_{2,3}$ بررسی شد. در نهایت با سکانس محصول PCR بیان ژن مورد نظر در باکتری اشرشیاکلی اورینگامی تایید شد.

نتایج Real time PCR

قرار گرفت. نتایج درخت فیلوژنتیکی به روش پیوند همجواری (NJ) نشان می‌دهد که گونه‌های استریتومایسس که بیانگر رابطه خویشاوندی نزدیک آن‌ها با هم بود (شکل ۹).



شکل ۸. نتایج Real time PCR



شکل ۹. درخت فیلوژنی رسم شده بر اساس توالی ژن $16srRNA$.

در تجزیه ترکیبات هیدروکربنی نقش کلیدی ایفا می‌کنند. ترکیبات هیدروکربنی دارای اجزای مختلفی هستند که ترکیبات آروماتیک از فراوانترین آن‌ها هستند و توسط آنزیم های دی اکسیژناز تخریب می‌شوند. گونه‌های استریتومایسس به فراوانی در طبیعت وجود دارند و از این رو چنانچه آنزیم مطلوب در این باکتری یافت شود، استفاده از آن در صنعت

بحث

نفت خام یکی از مهمترین نهاده‌ها در صنایع انرژی و شیمیایی است که با توجه به رسوبات طبیعی و انتشار گسترده گازهای سمی حاصل از آن، یکی از شایع‌ترین آلاینده‌های آلی برای محیط زیست به حساب می‌آید. پالایش زیستی منابع آلوده به ترکیبات نفتی راهکاری مناسب برای پاکسازی این منابع می‌باشد که در این فرآیند میکروارگانیسمها و به ویژه باکتری‌ها

مقرون به صرفه است. مصارف آن در پزشکی می‌تواند کاندید مناسبی برای داروهای شیمیایی گران قیمت باشد. کاتکول در نتیجه تجزیه بسیاری از ترکیبات آلاینده آروماتیک نظیر فنل، تولوئن، استیرن، بنزن، آنیلین، فتالات و مشتقات آن‌ها به صورت یک ترکیب حد واسط شکل می‌گیرد. همچنین سمیت کتکول از فنل بیشتر می‌باشد و لذا حذف آن از آلاینده‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است (Kumar et al., 2005). آنزیم کاتکول ۲ و ۳ دی اکسیژناز مهم‌ترین آنزیم دخیل در تجزیه کاتکول است و لذا بررسی دقیق ویژگی‌های آن از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین منظور در پژوهش‌های متعددی ژن رمز کننده این آنزیم کلون شده است. به عنوان نمونه می‌توان به پژوهش Nakai و همکاران در سال ۱۹۹۵ اشاره کرد. این گروه به منظور تکثیر این ژن با استفاده از PCR از پرایمرهای طراحی شده بر اساس توالی آمینواسیدی استفاده کردند. سپس پروتئین بیان شده تحت اپران *lac* در *E. Coli* مورد بررسی قرار گرفت (Nakai et al., 1995).

براساس مطالعه He و همکاران، کاتکول آنزیم اصلی تخریب آروماتیک است. در این بررسی با استفاده از تکنیک Real time PCR و کلونینگ، تنوع و الگوهای توزیع ژن‌های $C_{2,3}$ در رسوبات سطحی دریا بوهای مشخص گردید. نتایج نشان داد که رسوبات دریای بوهای حامل ژن‌های مربوط به زیر خانواده $C_{2,3}$ بودند و نمونه‌ها از منطقه تخلیه خاک و مزرعه پرورش آبی جدا شد (He et al., 2016). ترکیبات جدا شده از ژن‌های $C_{2,3}$ خاک در مقایسه با نمونه‌های خلیج بوهای نشان داد، کربن آلی کل یک عامل تعیین کننده مهم برای تغییر ترکیب است.

Huang و همکاران ژن کاتکول ۲ و ۳-دی اکسیژناز ($C_{2,3}$) را از استریتومایسس جداسازی نمودند. پس از استخراج DNA به وسیله PCR ژن مورد نظر تخلص، سپس RNA آن استخراج و cDNA ساخته شد. ژن کاتکول در پلاسمید کاتابولیک نفتالین کلون شده و توالی یابی شد. ژن *ND6*

$C_{2,3}$ در *Escherichia coli DH 5 α* با استفاده از پروموتور لاک pUC18 بیان شد و محصول ژن آن توسط کروماتوگرافی DEAE-Sephacel و Phenyl-Sepharose CL-4B خالص شد. ژن $C_{2,3}$ از ۹۲۴ نوکلئوتید تشکیل شده و یک پلی پپتید با وزن مولکولی ۳۶ کیلو دالتون حاوی ۳۰۷ مانده اسید آمینه را کدگذاری می‌کرد آزمایش‌های آنزیمی نشان داد که خلوص و مقاومت $C_{2,3}$ جدا شده از استریتومایسس نسبت به سودوموناس بهتر بود (Huang et al., 2010). نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده سازگاری این میکروارگانیسم‌ها به محیط ریزوسفر و به دنبال آن ارتقا پتانسیل آن‌ها برای پاکسازی آلودگی‌های نفتی می‌باشد. نتایج این تحقیق به عنوان یک مرحله اساسی در راستای توسعه گیاه پالایی خاک‌های آلوده در جنوب غرب ایران محسوب می‌گردد.

در بررسی Heydari و همکاران میزان فعالیت آنزیم کاتکول ۲ و ۳ دی اکسیژناز بعد از اندازه گیری میزان توانایی تولید بیوسورفکنانت مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌های انجام شده نشان داد که جدایه‌های T16 و B3 دارای آنزیم کاتکول ۲ و ۳ دی اکسیژناز هستند که این جدایه‌ها توانایی بالایی در امولوسیون کنندگی و در مقابل توانایی کمتری در پخش نفت و پاشش قطره از خود نشان دادند (Heydari et al., 2018).

Montazer و همکاران نشان دادند که اغلب هیدروکربن‌های آروماتیک حلقوی در محیط دریا پایداری زیادی داشته و در صورت ورود به بدن آبزیان در بافت‌های چربی تجمع می‌یابند (Montazer et al., 2019). سرطانزایی، جهش‌زایی و ایجاد اختلالات جنینی از جمله آثار سمی این ترکیبات است. از این رو تحقیق حاضر با هدف جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه کننده نفتالین و مقایسه توانایی آن‌ها در حذف این ماده انجام شد. به طور کلی نتایج نشان می‌دهد که باکتری‌های استریتومایسس جدا شده در حذف این آلاینده از محیط کشت توانا بوده و بنابراین می‌توان

این گونه‌ها را برای انجام آزمایش‌های میدانی پیشنهاد کرد و در شرایط آلودگی بالا، از آن‌ها استفاده کرد. پس از نمونه‌برداری از رسوبات آلوده نفتی و انجام مراحل غنی‌سازی باکتری‌های مقاوم به ماده فوق، جداسازی و سپس خالص‌سازی شدند. از ۸ گونه باکتری به دست آمده ۲ گونه که پس از سه روز از تلقیح از جذب نوری بالاتر و pH محیط کشت کمتری برخوردار بودند.

در مطالعه Babaei و همکاران تجزیه زیستی هیدروکربن های نفتی توسط گونه های میکروبی موجود در خاک آلوده به مواد نفتی به منظور بررسی قابلیت این دسته از میکروارگانیسم ها در راستای حذف آلاینده های نفتی مورد مطالعه قرار گرفت. خاک آلوده به مواد نفتی از پالایشگاه کرمانشاه جمع آوری شده و تلقیح میکروارگانیسم ها در سه مرحله کشت در محیط جامد، غنی سازی و کشت در محیط آبی انجام شد. حذف هیدروکربن های نفتی در شرایط هوایی در یک راکتور بیولوژیکی محتوی میکروارگانیسم های کشت شده انجام گردید. راکتور با ظرفیت شامل دو گونه ۳۶ لیتر به دو بخش هوایی و ته نشینی تقسیم شده و بر اساس سیستم لجن فعال کار می کند. باکتری های تلقیح شده که عمدتاً استریتومایسس هستند قادرند از هیدروکربن های نفتی به عنوان منبع کربن و انرژی استفاده کنند. همچنین تأثیر عواملی نظیر دما، PH، مواد مغذی و زمان ماند بر عملکرد راکتور مورد بررسی قرار می گیرد. تجزیه زیستی هیدروکربن های نفتی توسط باکتری های تلقیح شده منجر به کاهش قابل ملاحظه سطح هیدروکربن های نفتی در پساب خروجی می گردد (Babaei et al., 2013).

در مطالعه Xie و همکاران، کاتکول ۲ و ۳ دی اکسیژناز از باکتری استریتومایسس به عنوان آنزیم اصلی برای تجزیه بیولوژیکی هیدروکربن های آروماتیک جدا شد. ژن کاتکول ۲ و ۳ دی اکسیژناز از DNA استریتومایسس تخلیص و به پلاسمید گونه *P. Putida BNF* تلقیح و کلون شد. توالی نوکلئوتیدی کاتکول ۲ و ۳ دی اکسیژناز ($C_{2,3}$) با ۹۲۴ جفت

باز کد کننده تشکیل شده که یک پلی پپتید ۳۰۷ اسید آمینه را رمزگذاری می کند (Xie et al., 2014). ژن $C_{2,3}$ در کروموزوم *Acinetobacter* sp ادغام شد و نو ترکیب BS3- $C_{2,3}$ تشکیل شد که می تواند پروتئین کاتکول ۲ و ۳ دی اکسیژناز را بیان کند. نو ترکیب-BS3 $C_{2,3}$ قادر به تخریب هیدروکربن های مختلف معطر و N-alkanes است. ویژگی و فعالیت بالای این آنزیم نشان می دهد که BS3- $C_{2,3}$ کاندید بالقوه ای برای تجزیه تخریب روغن خام باشد (Xie et al., 2019).

در مطالعه Hassan و Aly، تمرکز بر بررسی توانایی سویه های استریتومایسس برای تخریب BTEX در دامنه pH قلیایی بود. بر این اساس، کاتکول ۲ و ۳ دی اکسیژناز ($C_{2,3}$) استخراج شده با استفاده از خواص جنبشی در پلاسمید تلقیح و به باکتری میزبان منتقل و در *E. Coli* DH5 α کلون شد. کاتکول تکثیر شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتیجتاً کاتکول ۲ و ۳ دی اکسیژناز به عنوان تجزیه کننده آلاینده های نفتی جدا شده از استریتومایسس خاک شناخته شد. این یافته ممکن است به منظور برآورد پتانسیل واقعی این سویه مورد استفاده در حذف آلاینده های BTEX یا از بین بردن طبیعی محل های آلوده BTEX قلیایی ضروری باشد (Hassan & Aly, 2018).

در یک پژوهش دیگر که در سال ۲۰۰۰ منتشر شد، ژن رمزگذار کاتکول ۲ و ۳ دی اکسیژناز ترموفیل از استریتومایسس ستونی همسانه سازی و بیان شد (An et al., 2001). در پژوهش دیگری که در سال ۲۰۰۶ توسط Matsumura و همکاران انجام گرفت ژن *catA* در اشرشیاکلی بیان و پروتئین حاصل با ستون MonoQ جداسازی و مورد بررسی قرار گرفت (Matsumura et al., 2006). در مطالعه حاضر ژن $C_{2,3}$ با استفاده از پرایمرهای طراحی شده اختصاصی بر اساس توالی به دست آمده با استفاده از PCR تکثیر و پس از قرار گرفتن در وکتور PTG19-T به اشرشیاکلی اورینگامی اورینگامی منتقل شد.

افزایش تولید این آنزیم در صنعت محسوب شود. همچنین بررسی بیشتر برای پیدا کردن سویه‌های جدید تولید کننده آنزیم کاتکول ۲ و ۳ دی اکسیژناز می‌تواند منجر به پیدا کردن روش نوین حذف آلاینده‌های نفتی گردد.

تضاد منافع

نویسندگان اعلام می‌دارند که تضاد منافی وجود ندارد.

References

An HR., Park HH. and Kim ES. Cloning and expression of thermophilic catechol 1,2-dioxygenase gene (catA) from *Streptomyces setonii*. FEMS Microbiol Lett, 2001; 195(1): 17-22. doi:10.1111/j.1574-6968.2001.tb10491.x.

Asiabadi FI., Mirbagheri SA., Najafi P. and Moatar F. Phytoremediation of petroleum-contaminated soils around Isfahan Oil Refinery (Iran) by sorghum and barley. Curr World Environ, 2014; 9(1): 65.

Babaei S., Najafi F., Soltani N., Khavari-Nejad R. and Abbaspanah B. Physiological responses of *Anabaena* sp. ISC55 to crude oil and its potential for biodegradation. Int J Algae, 2013; 15(3): 264-273.

Cohen SN. DNA cloning: a personal view after 40 years. Proc Natl Acad Sci, 2013; 110(39): 15521-15529.

Glick BR. and Patten CL. Molecular biotechnology: principles and applications of recombinant DNA: 5nd ed., John Wiley & Sons, 2017.

Hassan HA. and Aly AA. Isolation and characterization of three novel catechol 2, 3-dioxygenase from three novel haloalkaliphilic BTEX-degrading *Pseudomonas* strains. Int J Biol Macromol, 2018; 106: 1107-1114.

He P., Li L., Liu J., Bai Y. and Fang X. Diversity and distribution of catechol 2,

از جمله محدودیتهای این مطالعه می‌توان به نمونه گیری از خاک حاوی ترکیبات نفتی و روغنی که به سایر مواد و ترکیبات آمیخته بود اشاره نمود.

نتیجه گیری

این مقاله حاصل از پایان نامه و برای اخذ درجه کارشناسی ارشد می‌باشد. در نتیجه این مطالعه و در راستای ایجاد میزبان نو ترکیب با قابلیت بالای بیان، می‌تواند گام بزرگ در مسیر

3-dioxygenase genes in surface sediments of the Bohai Sea. FEMS Microbiol Lett, 2016; 363(10): fnw086.

Huang YJ., Jiang YB., Fossey JS., James TD. and Marken F. Assembly of N-hexadecyl-pyridinium-4-boronic acid hexafluorophosphate monolayer films with catechol sensing selectivity. J Mater Chem, 2010; 20(38): 8305-8310.

Heydari Q., Qavidel A., Khosh Kholq Sima N. and Ebadi A. investigating the activity of catechol 2,3 dioxygenase enzyme in bacteria isolated from soil contaminated with crude oil. the first international conference and the fourth national conference on conservation of natural resources and environment, 2018; 128-132.

Indira G. In vitro antifungal susceptibility testing of 5 antifungal agents against dermatophytic species by CLSI (M38-A) micro dilution method. Clin Microbiol, 2014; 3(3): 145.

Kumar A, Kumar S, Kumar S. Biodegradation Kinetics of Phenol and Catechol Using *Pseudomonas putida* MTCC 1194. Biochemical Engineering, 2005; 22: 151-159.

Li L., Cole J. and Margolin DA. Cancer stem cell and stromal microenvironment. Ochsner J, 2013; 13(1): 109-118.

Mahon CR., Lehman DC. and Manuselis G.

Textbook of diagnostic microbiology-e-book. 6nd ed., Elsevier Health Scienc, 2018.

Masters EA., Hao SP., Kenney HM., Morita Y., Galloway CA., de Mesy Bentley., et al. Distinct vasculotropic versus osteotropic features of *S. agalactiae* versus *S. aureus* implant-associated bone infection in mice. *J Orthop Res*, 2021; 39(2): 389-401.

Matsumura E., Sakai M., Hayashi K., Murakami S., Takenaka S. and Aoki K. Constitutive expression of catABC genes in the aniline-assimilating bacterium *Rhodococcus* species AN-22: production, purification, characterization and gene analysis of CatA, CatB and CatC. *Biochem J*, 2006; 393(Pt 1): 219-226. doi:10.1042/BJ20050740.

Montazer Z., Habibi Najafi MB. and Levin DB. Challenges with verifying microbial degradation of polyethylene. *Polymers*; 2020; 12(1):123.

Montazer Z., Habibi Najafi MB. and Levin DB. Microbial degradation of low-density polyethylene and synthesis of polyhydroxyalkanoate polymers. *Can J Microbiol*; 2019; 65(3): 224-34.

Nakai C., Uyeyama H., Kagamiyama H., Nakazawa T., Inouye S., Kishi, F., et al. Cloning, DNA sequencing, and amino acid sequencing of catechol 1,2-dioxygenases (pyrocatechase) from *Pseudomonas putida* mt-2 and *Pseudomonas arvilla* C-1. *Arch Biochem Biophys*, 1995; 321(2): 353-362. doi:10.1006/abbi.1995.1405.

Nathans D. and Ho S. Restriction endonucleases in the analysis and restructuring of DNA molecules. *Annu Rev Biochem*, 1975; 44: 273-93.

Primrose SB. and Twyman R. Principles of gene manipulation and genomics. 7nd ed., Wiley-Blackwell, 2013.

Sánchez-Suárez J., Coy-Barrera E., Villamil L. and Díaz L. Streptomyces-derived metabolites with potential photoprotective properties-A systematic literature review and meta-analysis on the reported chemodiversity. *Molecules*, 2020; 25(14): 3221.

Watson JD., Myers RM., Caudy AA. and Witkowski J. A. Recombinant DNA: genes and genomes: a short course. 3nd ed., Macmilla, 2007.

Weinberg R. and Hanahan D. The hallmarks of cancer. *Cell*, 2000; 100(1): 57-70.

Xie YF., Feng WW., Liu MC., Xie J., Yu L., Gong XH., et al. Investigation of efficacy enhancing and toxicity reducing mechanism of combination of aconiti lateralis radix praeparata and paeoniae radix alba in adjuvant-induced arthritis rats by metabolomics. *Evid-based Complement Altern Med*, 2019; 2019: 9864841.

Xie Y., Yu F., Wang Q., Gu X. and Chen W. Cloning of catechol 2, 3-dioxygenase gene and construction of a stable genetically engineered strain for degrading crude oil. *Indian J Microbiol*, 2014; 54(1): 59-64.



Cloning and Expression of *Catechol 2,3-Dioxygenase* Genes of *Streptomyces* Living in the Soil in *Escherichia Coli* Bacteria to Remove Oil Pollutants

Alireza Fathipour¹, Mehdi Nasirinejad¹, Solaleh Sadat Mirsifi Fard², Sarvenaz Falasfi³, Majid Sadeghpour⁴, Kumarss Amini⁵

¹Professional Doctorate Student in Veterinary Medicine, Clinic Department, Faculty of Veterinary Medicine, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran

²Master's Degree in Microbiology, Department of Microbiology, Faculty of Medical Sciences, Department of Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran

³Assistant Professor, Department of Microbiology, Faculty of Medical Sciences, Medical Sciences Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

⁴Senior Expert in Microbiology, Scientific Member of the Iranian Microbiology Association, Tehran, Iran

⁵Associate Professor, Department of Microbiology, Faculty of Basic Sciences, Saveh branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran

Received: 22/Nov/2022

Revised: 23/Dec/2022

Accepted: 29/Dec/2022

Abstract

Background and aim: Today, the widespread use of petroleum products has led to environmental pollution and has created serious problems for the health of the environment. *Streptomyces* make up 50% of the total population of soil *actinomycetes* are filamentous, gram-positive, and essentially aerobic. These bacteria are abundant in natural aquatic and terrestrial environments, are not nutritionally hardy, require only a source of carbon and nitrogen along with mineral salts, and they are able to remain in the soil as spores for a long time. The aim of the study was to clone the *Streptomyces catechol 2, 3-dioxygenase* gene ($C_{2,3}$) present in the soil in *Escherichia coli* bacteria in order to remove oil pollutants.

Materials and Methods: In this study, 58 samples were collected from a depth of 5 to 10 cm in different areas of the suburb of Tehran and oil contaminated areas such as the oil depot and its surroundings. After culturing, diluting and selecting suspicious *Streptomyces* colonies for identification, after confirmation of *Streptomyces* bacteria based on colony appearance, microscopic characteristics, and biochemical tests for final confirmation of molecular identification, their 16srRNA sequence was amplified and replicated, was examined. In the next step, after DNA extraction of the samples, PCR was used to amplify the $C_{2,3}$ gene. The $C_{2,3}$ gene was then cloned into *Escherichia coli Origami* by PTG19-T vector. Finally, the amount of gene expression was determined by Real Time PCR and after sequencing the phylogenetic tree was drawn.

Results: The enzyme catechol 2, 3-dioxygenase can be extracted from limited sources such as *Streptomyces*, so the need for gene amplification of this enzyme is important from the bacterial sources that produce it. Therefore, in this study, this enzyme was isolated from *Streptomyces*. As a result of this study, we were able to find native *Streptomyces* that produce the enzyme catechol 2, 3-dioxygenase, and finally, the gene of this enzyme was successfully introduced into *Escherichia coli Origami*.

Discussion: In this study, in order to create of a recombinant host with high expression capacity, it can be considered a big step towards increasing the production of this enzyme in the industry. Further investigation to find new strains producing catechol 2, 3-dioxygenase can lead to a new method of removing oil contaminants.

Keywords: *Catechol 2, 3-dioxygenase* enzyme, $C_{2,3}$ gene, *Streptomyces*, 16srRNA, cloning, *E. Coli Origami*

Cite this article as: Alireza Fathipour, Mehdi Nasirinejad, Solaleh Sadat Mirsifi Fard, Sarvenaz Falasfi, Majid Sadeghpour, Kumarss Amini. Cloning and expression of *catechol 2, 3-dioxygenase* genes of *Streptomyces* living in the soil in *Escherichia Coli* bacteria to remove oil pollutants. J Altrn Vet Med. 2022; 5(15): 881-896.

* Corresponding Author

Department of Biology, Faculty of Sciences, Zand Institute of Higher Education, Shiraz, Iran.

E-mail: ebrahim.hossini@yahoo.com, Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7581-5835>