



تأثیر عصاره آبی گیاه مخلصه (*Tanacetum parthenium* L.) بر روند رشد باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در شیر و ماست پروبیوتیک

مسعود حسینی^۱، محمد حسین مرحمتی زاده^{۱*}، آرش پایه دار^۲

گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران
گروه زیست شناسی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ اصلاح نهایی: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۱۱/۲۸

چکیده

زمینه و هدف: گیاه مخلصه یک گیاه دارویی است که در طیف وسیعی از بیماریها کاربرد دارد. با این حال تاکنون تأثیر این گیاه بر روی رشد باکتریهای پروبیوتیک بررسی نشده است. در این تحقیق امکان تولید ماده غذایی بر پایه شیر و ماست پروبیوتیکی با عصاره آبی گیاه مخلصه (*Tanacetum parthenium* L.) مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روشها: جهت تعیین تأثیر دوزهای مختلف عصاره آبی گیاه مخلصه بر رشد باکتری های پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در مرحله اول (شیر) و در مرحله دوم (ماست)، ۰/۳۳ گرم از باکتری لیوفلیزه ی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به طور جداگانه به یک لیتر شیر کم چرب استریلیزه افزوده گردید. اسیدیته، pH و رشد میکروب ها در دوران گرمخانه گذاری و ماندگاری مورد بررسی قرار گرفت و در روز هفتم پس از تولید محصولات مورد ارزیابی حسی قرار گرفتند. همچنین، در انتهای مطالعه میزان کلسترول و تری گلیسرید موشهای صحرایی اندازه گیری شد.

یافته ها: در نمونه های حاوی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم مشاهده شد که افزایش غلظت عصاره آبی گیاه مخلصه طعم مطلوبی به ماست داد و در تمامی نمونه ها ماست دارای قوام بسیار خوبی بود و ماست ۰/۱٪ مخلصه بهترین طعم را داشت. در ارزیابی کشت میکروبی، باکتری های پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم بیفیدوم نسبت به لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس روی محیط MRS Agar رشد خوبی نداشتند. با بررسی نتایج مشخص شد که افزایش غلظت عصاره آبی گیاه مخلصه اثر مثبت بر روی رشد باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در شیر و ماست پروبیوتیکی داشت. در ادامه جهت ارزیابی اثر بخشی تولیدات شیر پروبیوتیکی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس با غلظتهای مختلف عصاره آبی گیاه مخلصه بر میزان کلسترول و تری گلیسرید موشهای صحرایی، بررسی ها و آزمایشهای تجربی صورت گرفت که شیر پروبیوتیکی حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و همچنین شیر پروبیوتیکی حاوی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم حاوی عصاره مخلصه ۰/۱٪ بیشترین تأثیر را در کاهش کلسترول داشتند. شیر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس حاوی ۰/۱٪ عصاره آبی مخلصه و شیر بیفیدوباکتریوم بیفیدوم حاوی عصاره ۰/۳٪ مخلصه بیشترین تأثیر را در کاهش تری گلیسرید در موشهای صحرایی داشتند.

نتیجه گیری: عصاره آبی گیاه مخلصه دارای اثر مثبت بر روی رشد باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در شیر و ماست پروبیوتیکی است. همچنین، شیر پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم حاوی عصاره آبی مخلصه تأثیر مثبتی در کاهش کلسترول و تری گلیسرید در موشهای صحرایی دارد.

واژه های کلیدی: عصاره آبی گیاه مخلصه، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، تری گلیسرید، کلسترول، پروبیوتیک

مسعود حسینی، محمد حسین مرحمتی زاده، آرش پایه دار. تأثیر عصاره آبی گیاه مخلصه (*Tanacetum parthenium* L.) بر روند رشد باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در شیر و ماست پروبیوتیک. مجله طب دامپزشکی جایگزین. ۱۴۰۰؛ ۴(۱۱): ۶۵۴-۶۶۷.

مقدمه

امروزه مصرف کنندگان مواد غذایی به مواردی مانند طعم مطبوع، پایین بودن کالری و چربی و اثر مفید غذا بر سلامتی توجه خاصی دارند. از این رو صنایع غذایی در تلاش است محصولات تولید نماید که طعم و خواص بهتری داشته باشند که در این بین فرآورده های شیری فرآوری شده با پروبیوتیک ها از اهمیت زیادی در ارتقا سلامت برخوردار می باشند (Ferdowsifard *et al.*, 2011). مصرف ماست با توجه به فواید سلامتی بخش آن در طول سال ها افزایش یافته است. ماست یکی از مهمترین مواد غذایی لبنی تخمیر شده است (Ershidat & Mazahreh, 2009). در سال های اخیر میل به استفاده از باکتری های مفیدی به نام پروبیوتیک ها به عنوان یک رژیم کمکی در صنایع غذایی رویه رشد بوده است (Ferdowsifard *et al.*, 2011). پس از مصرف مقدار کافی از پروبیوتیک ها، اثرات مفیدی بر روی جمعیت میکروبی طبیعی دستگاه گوارش مشاهده می شود. رایج ترین باکتری های پروبیوتیک شامل لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم است (Ershidat & Mazahreh, 2009). از اثرات سلامت بخش پروبیوتیک ها می توان به خواص ضد جهش زایی و ضد سرطانی، تقویت و تنظیم سیستم ایمنی، خواص ضد میکروبی، کاهش کلسترول سرم، بهبود عدم تحمل لاکتوز و افزایش ارزش تغذیه ای اشاره کرد (Marhamatizadeh *et al.*, 2012a). اسانس های گیاهی و اجزای تشکیل دهنده آن ها دارای آثار شناخته شده ضد باکتریایی هستند. کاربردهای فراوان آن ها به منظور کنترل رشد باکتری های بیماری زا با منشا غذایی و باکتری های عامل فساد، موجب به کارگیری آن ها به عنوان نگهدارنده های غذایی شده است (Sadeghi *et al.*, 2010). گیاه مخلصه (*Tanacetum parthenium* L.) از گیاهانی است که بطور سنتی در درمان بیماری های مختلف مخصوصا درمان دردهای میگرنی، دردهای مفاصل، به عنوان تب شکن و ضد تب کاربرد دارد، همچنین ضد اسپاسم، ضد

التهاب، ضد نفخ نیز می باشد (Pareeket *al.*, 2011). تاکنون مطالعه ای بر روی تاثیر گیاه مخلصه بر باکتریهای پروبیوتیک انجام نشده است با این حال، در مطالعه ای که بر روی گیاه آویشن بر فعالیت باکتری های پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در شیر و ماست انجام گرفته است نشان داده شده است که افزایش غلظت آویشن می تواند اثرات مثبتی بر رشد باکتری های پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در شیر و ماست داشته باشد (Marhamatizadeh *et al.*, 2011a). در مطالعه ای دیگر، اثرات ماست و شیر پروبیوتیک در افراد نورموکلسترولمیک و هیپرکلسترولمیک بررسی شد و مشاهده گردید که هر چه سطح کلسترول خون بالاتر باشد، مصرف ماست و به ویژه ماست پروبیوتیک به جای شیر در رژیم غذایی سودمندتر خواهد بود (Ataei Jafari *et al.*, 2008). هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر عصاره آبی گیاه مخلصه بر روند رشد باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در شیر و ماست پروبیوتیک بود و همچنین تاثیر عصاره مخلصه بر میزان کلسترول و تری گلیسرید موشهای صحرایی تغذیه شده با شیر پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بود.

مواد و روش ها

تهیه عصاره آبی گیاه مخلصه

گیاه کامل مخلصه شامل بخشهای هوایی و ریشه از مزارع اطراف شهرستان کازرون جمع آوری گردید و به قطعات کوچک خرد شد و در مجاورت هوا خشک گردید. قطعات در محلول کربس ۲۶ میلی مولار (Merck, Germany) همگن شدند، فیلتر شدند و محلول استوک معادل ۲۰ میلی گرم گیاه خشک در ۱ میلی لیتر تهیه شد. عصاره حاصل در دور ۲۵۰۰ به مدت ۳۰ دقیقه سانتریفیوژ (Centric 150, Domel Co., China) شد و مایع شفاف رویی جدا گردید

(Capasso, 1986). پس از جداسازی مایع شفاف رویی، غلظت‌های مناسب این مطالعه (۰/۱٪، ۰/۲٪ و ۰/۳٪) تهیه گردید.

تأثیر عصاره مخلصه در تولید شیر پروبیوتیکی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در پاساژ اول

به منظور تولید شیر حاوی باکتری پروبیوتیکی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم (CHR Hansen co, Denmark) چهار ظرف حاوی یک لیتر شیر کم چرب استریلیزه ۱ درصد چربی (شرکت کاله، ایران) به عنوان چهار گروه در نظر گرفته شد. سپس به تمامی ظرفها مقدار ۰/۳۳ گرم باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم به طور مستقیم افزوده گردید در ادامه به ظرفها به ترتیب ۰/۱٪ (شاهد)، ۰/۱٪، ۰/۲٪ و ۰/۳٪ عصاره مخلصه افزوده شد. تمامی ظرف ها در دمای ۳۸ درجه سانتی گراد گرمخانه گذاری شدند. تقریباً هر دو ساعت یک بار آزمون اسیدیته تا رسیدن به اسیدیته ۴۲ درجه دورنیک انجام گرفت (Standard Institute and Industrial Search of Iran, 2006). پس از رسیدن اسیدیته نمونه ها به ۴۲ درجه دورنیک نمونه ها از گرمخانه خارج و به یخچال با دمای ۲ درجه سانتی گراد انتقال داده شد. شیر پروبیوتیکی تولید شده هر ۷ روز یک بار جهت شمارش میکروب ها بر روی محیط MRS Agar (Merck, Germany) به روش شمارش مستقیم مورد ارزیابی قرار گرفت (Marhamatizadeh et al, 2012a).

تأثیر عصاره مخلصه در تولید ماست پروبیوتیکی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در پاساژ دوم

به منظور تولید ماست بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در این مرحله پس از تهیه ۴ ظرف مقدار یک لیتر شیر کم چرب استریلیزه و ۰/۳۳ گرم باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و ۱۵ گرم مایه ماست کم چرب (۱/۵٪) (شرکت کاله، ایران) به هر ظرف افزوده شد. غلظت های مختلف عصاره مخلصه (۰٪، ۰/۱٪، ۰/۲٪، ۰/۳٪) به ظرف ها به ترتیب افزوده گردید و خوب بهم زده تا مخلصه بصورت یکنواخت حل شود. سپس تمامی ظرفها در گرمخانه با دمای ۳۸ درجه سانتیگراد قرار داده شد. تقریباً هر دو

ساعت یک بار آزمون اسیدیته و pH تا رسیدن به اسیدیته ۹۰ درجه دورنیک انجام گرفت. پس از رسیدن اسیدیته نمونه ها به ۹۰ درجه دورنیک نمونه ها از گرمخانه خارج و به یخچال با دمای ۲ درجه سانتیگراد انتقال داده شد. ماست مخلصه پروبیوتیکی تولید شده هر ۷ روز یک بار جهت شمارش میکروب ها بر روی محیط MRS Agar به روش شمارش مستقیم مورد ارزیابی قرار گرفت.

تجزیه و تحلیل آماری

پس از ده روز، ماست ها از نظر ویژگی های حسی ارزیابی شدند. ارزیابی حسی با استفاده از پرسش نامه در یک جمعیت ۵۰ نفری انجام شد. در پرسش نامه هر کدام از عوامل عطر، بو، طعم، مزه و قوام ماست ها در چهار سطح خیلی خوب، خوب، متوسط و ضعیف مورد سوال قرار گرفت. نتایج پرسش نامه در آزمون آماری توصیفی و با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن ۱۷ مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

بررسی تأثیر عصاره مخلصه در تولید شیر پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در پاساژ اول

تمام مراحل مانند تولید شیر پروبیوتیکی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم (۰/۳۳ گرم) انجام شد با این تفاوت که از باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به جای باکتری بیفیدوباکتریوم استفاده شد.

بررسی تأثیر عصاره مخلصه در تولید ماست پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در پاساژ دوم

تمام مراحل مانند تولید ماست پروبیوتیکی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم (۰/۳۳ گرم) انجام شد با این تفاوت که از باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به جای باکتری بیفیدوباکتریوم استفاده شد.

تأثیر شیر پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس حاوی عصاره مخلصه بر میزان کلاستروول و تری گلیسرید موشهای صحرائی

برای چهار گروه باقی مانده جیره پرچرب متوقف گردید و به مدت ۷ روز دیگر:

گروه ۳ (شاهد) با جیره بالانس تغذیه شد.

گروه ۴ با شیر پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و عصاره ۰/۱٪ مخلصه تغذیه شد.

گروه ۵ با شیر پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و عصاره ۰/۲٪ مخلصه تغذیه شد.

گروه ۶ با شیر پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و عصاره ۰/۳٪ مخلصه تغذیه شد.

طی این مدت تغذیه شیر برای هر موش صحرائی روزانه به مقدار ۳۰ میلی لیتر بود و پس از این دو هفته از هر چهار گروه باقی مانده خونگیری انجام شد و به آزمایشگاه ارسال گردید.

تأثیر شیر پروبیوتیکی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم حاوی عصاره مخلصه بر میزان کلسترول و تری گلیسرید موشهای صحرائی

تمام مراحل مانند مرحله قبل انجام گرفت با این تفاوت که از باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم به جای باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس استفاده شد.

روش اندازه گیری کلسترول و تری گلیسرید سرمی

برای تهیه نمونه سرمی از نمونه خونهای ارسالی، نمونه ها یک تا دو مرتبه با دور ۳۵۰۰ به مدت ۵ دقیقه سانتریفیوژ شدند و سرمها جدا گردیدند. از طرفی برای آماده کردن معرف های کیت کلسترول (زیست شیمی، ایران) و تری گلیسرید (زیست شیمی، ایران)، برای هر کدام جداگانه Reagent A و Reagent B مخصوص خود با نسبت ۲ به ۱ مخلوط شد. برای سنجش تیترا کلسترول و تری گلیسرید طبق دستورالعمل کیت شرکت سازنده (زیست شیمی، ایران) عمل شد.

نتایج

نمودار ۱ و ۲ اسیدیته برحسب درجه دورنیک در شیر و ماست لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس طی گرمخانه گذاری را نشان می دهد. نمودار ۳ و ۴ اسیدیته بر حسب درجه دورنیک در شیر و

به منظور بررسی اثر شیر پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (CHR Hansen co, Denmark) حاوی عصاره مخلصه بر میزان کلسترول و تری گلیسرید در ابتدا موشهای صحرائی که از نظر ساختار فیزیولوژیکی، ژنتیکی و شرایط محیطی وضعیت یکسانی داشتند تهیه شدند. بدین منظور تکثیر موشهای صحرائی طی ۴۵ روز انجام گرفت و موشهای صحرائی بالغ هم سن (۴۵ روزه)، هم جنس (ماده)، هم وزن (۲۰۰ گرم) و با شرایط محیطی و تغذیه ای یکسان (دما، رطوبت، نور، بستر، آب و خوراک و ...) حاصل گردید. سپس موشهای صحرائی به ۶ گروه ۶ تایی تقسیم شدند:

گروه ۱: گروه کنترل اول با جیره بالانس (بدون جیره پرچرب یا هرگونه پروبیوتیک و عصاره)

گروه ۲: گروه کنترل دوم با جیره پرچرب (پلت و چربی حیوانی)

گروه ۳: گروه شاهد تغذیه شده با لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بدون عصاره مخلصه

گروه ۴: گروه تغذیه شده با شیر پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و عصاره ۰/۱٪ مخلصه

گروه ۵: گروه تغذیه شده با شیر پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و عصاره ۰/۲٪ مخلصه


گروه ۶: گروه تغذیه شده با شیر پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و عصاره ۰/۳٪ مخلصه

در ابتدای تقسیم بندی، از گروه ۱ به عنوان کنترل اولیه، نمونه خون گرفته و به آزمایشگاه ارسال شد و گروه اول حذف گردید برای خونگیری موشهای صحرائی درون استوانه آغشته به اتر بیهوش شدند و با برش در دو طرف جناغ سینه و نمایان شدن قلب، خونگیری به صورت مستقیم از قلب انجام گردید. سپس پنج گروه باقی مانده با جیره پرچرب تهیه شده از پلت و چربی حیوانی با نسبت ۳ به ۱، طی مدت ۱۴ روز تغذیه شدند. پس از این دو هفته، از گروه ۲ به عنوان کنترل دوم، نمونه خون گرفته و به آزمایشگاه ارسال شد و گروه دوم نیز حذف گردید.


ماست پروبیوتیکی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم (طی گرمخانه گذاری) را نشان می دهد.

نمودار ۵ و ۶ مقایسه تاثیر شیر پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و شیر پروبیوتیکی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر


میزان کلستروال و تری گلیسرید سرمی موشهای صحرائی را نشان می دهد. جدول ۱ بررسی رشد میکروب ها در شیر و ماست لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم حاوی عصاره مخلصه را نشان می دهد.




نمودار ۱. اسیدیته بر حسب درجه دورنیک در شیر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس طی گرمخانه گذاری.



نمودار ۲. اسیدیته بر حسب درجه دورنیک در ماست لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس طی گرمخانه گذاری.



نمودار ۳. ارزیابی اسیدیته بر حسب درجه دورنیک در شیر پروبیوتیکی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم طی گرمخانه گذاری.




نمودار ۴. اسیدیته بر حسب درجه دورنیک در ماست پروبیوتیکی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم طی گرمخانه گذاری.


روز پنزدهم	روز اول	ماست مخلصه BB	روز پنزدهم	روز اول	شیر مخلصه BB	روز پنزدهم	روز اول	ماست مخلصه LA	روز پنزدهم	روز اول	شیر مخلصه LA
$5/25 \times 10^{11}$	8×10^{11}	%۰	8×10^{11}	$13/75 \times 10^{11}$	%۰	$1/75 \times 10^{11}$	$9/75 \times 10^{11}$	%۰	$5/75 \times 10^{11}$	15×10^{11}	%۰
$3/25 \times 10^{11}$	9×10^{11}	%۰/۱	9×10^{11}	$13/5 \times 10^{11}$	%۰/۱	$4/75 \times 10^{11}$	9×10^{11}	%۰/۱	$7/75 \times 10^{11}$	$12/75 \times 10^{11}$	%۰/۱
$2/75 \times 10^{11}$	$9/25 \times 10^{11}$	%۰/۲	$9/25 \times 10^{11}$	$42/5 \times 10^{11}$	%۰/۲	6×10^{11}	8×10^{11}	%۰/۲	11×10^{11}	$13/5 \times 10^{11}$	%۰/۲
$1/5 \times 10^{11}$	$7/25 \times 10^{11}$	%۰/۳	8×10^{11}	$17/25 \times 10^{11}$	%۰/۳	$6/5 \times 10^{11}$	6×10^{11}	%۰/۳	5×10^{11}	16×10^{11}	%۰/۳

جدول ۱. بررسی رشد میکروب ها در شیر و ماست لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم حاوی عصاره مخلصه.

LA: لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس. BB: بیفیدوباکتریوم بیفیدوم.



نمودار ۵. مقایسه تاثیر شیر پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر میزان کلسترول و تری گلیسرید سرمی (mg/dL) موشهای صحرایی. * مقایسه میانگین و انحراف معیار میزان کلسترول با گروه کنترل. ** مقایسه میانگین و انحراف معیار میزان تری گلیسرید با گروه کنترل.



نمودار ۶. مقایسه تاثیر شیر پروبیوتیکی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر میزان کلسترول و تری گلیسرید سرمی (mg/dL) موشهای صحرایی. * مقایسه میانگین و انحراف معیار میزان کلسترول با گروه کنترل. ** مقایسه میانگین و انحراف معیار میزان تری گلیسرید با گروه کنترل.

بحث

تولید یک فرآورده غذایی پروبیوتیکی جدید بر پایه شیر و مخلصه مورد ارزیابی قرار گرفت. تغییرات حاصله در شیر و ماست مخلصه، حاوی باکتری های بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و

در این تحقیق تاثیر مخلصه بر رشد باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و امکان

اگر چه اساس فرآورده های پروبیوتیک خاصیت دارویی (قابلیت زیستی) آن ها است اما خواص حسی این فرآورده ها نیز جایگاه پر اهمیتی دارند. به عبارت دیگر امتیاز مصرف پروبیوتیک ها از طریق مواد غذایی، و نه به صورت دارو، برخوردار از خواص حسی آن ها است. در میان فرآورده های پروبیوتیک فرآورده های تخمیری و به ویژه ماست پروبیوتیک به دلیل خواص حسی کم نظیر از مقبولیت جهانی برخوردار هستند. ماست پروبیوتیک را می توان مهمترین فرآورده پروبیوتیک به شمار آورد (Mortazavian & Sohrabvandi, 2006). به همین جهت در ارزیابی حسی که در روز ۷ بعد از تولید بین ۵۰ نفر صورت گرفت، محصولات ماست پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و غلظت های مختلف مخلصه از لحاظ عطر و بو، رنگ، قوام و طعم بررسی شدند. در پرسش نامه هر کدام از این عوامل در چهار سطح خیلی خوب، خوب، متوسط و ضعیف مورد سوال قرار گرفت. نتایج پرسش نامه در آزمون آماری توصیفی و با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن ۱۷ مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت برای آنالیز کردن روش Non parametric test مورد بررسی قرار گرفت. در نمونه ماست مخلصه حاوی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بین رنگ، قوام و طعم محصولات تفاوت معنی دار وجود داشت ($p < 0.05$). در نمونه های ماست لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس مشاهده شد که افزایش غلظت مخلصه، طعم و عطر و رنگ به خصوصی به ماست داد و افزایش غلظت مخلصه باعث افزایش قوام ماست شد به طوری که ماست شاهد که حاوی ۰٪ مخلصه بود قوام کمتری نسبت به نمونه های دیگر داشت. که در ارزیابی حسی بهترین طعم و رنگ مربوط به ماست لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس با غلظت ۰/۱٪ مخلصه بود. در شمارش مستقیم میکروبی، در روز پانزدهم نسبت به روز اول تعداد باکتری های شمارش شده کاهش نشان داده بود. ولی با این وجود در نمونه ماست پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس تعداد نمونه ها بر 10^7 CFU.ml⁻¹ میکروب بود. در ارزیابی کشت نمونه ها بر

لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس از نظر شاخص های اسیدیته، pH و قابلیت زیستی باکتری های پروبیوتیک در فرجه های زمانی به ترتیب دو ساعته برای رسیدن به اسیدیته ۴۲ درجه دورنیک (شیر) و ۹۰ درجه دورنیک (ماست) در گرمخانه ۳۸ درجه سانتیگراد ثبت گردید. در نمونه های شیر پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، حاوی عصاره ۰/۳٪ مخلصه سریع تر از بقیه نمونه ها به اسیدیته ۴۲ درجه دورنیک رسید و سپس نمونه ۰/۲٪ مخلصه و نمونه ۰/۱٪ مخلصه و در نهایت نمونه شاهد در شیر پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به اسیدیته ۴۲ درجه دورنیک رسیدند و پس از آن به یخچال با دمای ۲ درجه سانتیگراد انتقال داده شدند. ماندگاری محصول در یخچال ۱۵ روز تعیین شد و طی این مدت اسیدیته شیر ۰/۳٪ مخلصه بیشتر از بقیه نمونه ها بود.

باکتری های پروبیوتیکی برای این که خواص خود را در بدن فرد مصرف کننده مواد غذایی به وجود بیاورند باید به میزان حداقل 10^7 CFU.ml⁻¹ در گرم و به صورت زنده وجود داشته باشند (Mortazavian & Sohrabvandi, 2006). در شمارش مستقیم میکروبی، که در مجموع باکتری های شمارش شده در روز اول و پانزدهم در غلظت ۰/۲٪ از بقیه غلظت ها بیشتر بود. در این تحقیق میزان باکتری CFU.ml⁻¹ ۱۰^{۱۱} میکروب بود. بنابراین خواص مورد نظر میکروب های پروبیوتیکی را در مصرف کننده به وجود می آورند. در شمارش میکروب ها بر روی محیط MRS Agar تعداد کلنی ها 10^7 CFU.ml⁻¹ میکروب بود. ماست پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، حاوی ۰/۳٪ مخلصه سریع تر از بقیه نمونه ها به اسیدیته ۹۰ درجه دورنیک رسید و سپس نمونه ۰/۲٪ مخلصه، نمونه ۰/۱٪ مخلصه و در نهایت نمونه شاهد به اسیدیته ۹۰ درجه دورنیک رسیدند و پس از آن به یخچال با دمای ۲ درجه سانتیگراد انتقال داده شدند. ماندگاری محصول در یخچال بیش از ۱۵ روز تعیین شد و طی این مدت اسیدیته ماست ۰/۳٪ مخلصه بیشتر از بقیه نمونه ها بود.

روی محیط MRS Agar، تعداد کلنی های شمارش شده 10^7 CFU.ml⁻¹ کلنی بود. در نمونه های شیر پروبیوتیکی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم حاوی ۰/۳٪ مخلصه سریع تر از بقیه نمونه ها به اسیدیته ۴۲ درجه دورنیک رسید و سپس نمونه ۰/۲٪، نمونه ۰/۱٪ مخلصه با هم به اسیدیته ۴۲ درجه دورنیک رسیدند و در نهایت نمونه شاهد در شیر پروبیوتیکی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم به اسیدیته ۴۲ درجه دورنیک رسید و پس از آن به یخچال با دمای ۲ درجه سانتیگراد انتقال داده شدند. ماندگاری محصول در یخچال ۲۱ روز تعیین شد و طی این مدت اسیدیته شیر ۰/۲٪ مخلصه کمتر از بقیه نمونه ها بود. در شمارش مستقیم میکروبی، در روز پانزدهم نسبت به روز اول باکتری های شمارش شده در تمامی غلظت های مخلصه و نمونه شاهد با اینکه هنوز دارای ضریب لگاریتمی CFU.ml⁻¹ ۱۰^{۱۱} داشت ولی کاهش یافته بود. اثر بازدارندگی و کشندگی pH های پایین بر بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بیشتر از لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس است. از این رو بدیهی به نظر می رسد که طی ماندگاری محصول و افزایش فرآیند تخمیر که باعث کاهش pH می شود یکی از عوامل اصلی کاهش رشد بیفیدوباکتریوم می باشد (Mortazavian & Sohrabvandi, 2006). در ارزیابی کشت نمونه ها بر روی محیط MRS Agar، علیرغم اینکه در روز اول هیچکدام از نمونه ها در هیچ رقتی رشد نداشت، در روز پانزدهم بجز غلظت ۰/۲٪ که در هیچ رقتی رشد نداشت. در نمونه ماست پروبیوتیکی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم حاوی ۰/۲٪ و ۰/۳٪ عصاره مخلصه سریع تر از بقیه نمونه ها به اسیدیته ۹۰ درجه دورنیک رسید و سپس نمونه ۰/۱٪ مخلصه و در نهایت نمونه شاهد در ماست پروبیوتیکی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم به اسیدیته ۹۰ درجه دورنیک رسیدند و پس از آن به یخچال با دمای ۲ درجه سانتیگراد انتقال داده شدند. ماندگاری محصول در یخچال بیش از ۱۵ روز تعیین شد و طی این مدت اسیدیته ماست در سایر نمونه ها بین ۱۱۵ تا ۱۴۲ درجه دورنیک بود که البته این افزایش اسیدیته در زمان ماندگاری بدلیل فرآیند تخمیر

صورت گرفته بود. در ارزیابی حسی ماست مخلصه حاوی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و غلظت های مختلف مخلصه بین رنگ و طعم محصولات تفاوت معنی داری وجود داشت ($p < 0.05$) و ماست بیفیدوباکتریوم بیفیدوم حاوی عصاره ۰/۱٪ مخلصه بهترین طعم و رنگ را در ارزیابی حسی داشت. در ارزیابی کشت نمونه ها بر روی محیط MRS Agar، همگی محصولات ماست مخلصه حاوی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در روز اول در همه رقت ها و همه غلظت ها رشد قابل توجهی داشتیم، اما آن چیزی که به نظر می رسد با افزایش غلظت مخلصه رشد کمتر شده بود، در روز پانزدهم در غلظت ۰/۲٪ در همه رقت ها رشد داشتیم. با رشد میکروبی بر روی محیط MRS Broth برای نمونه های بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در تمامی غلظت ها و رقت ها محلول کدر شده بود که نشان دهنده رشد باکتری در محیط کشت است.

کاربرد عملکردی گیاهان مختلف به اشکال مختلف (به عنوان مثال پودر تازه، عصاره، اسانس و غیره) در برخی از محصولات لبنی با موفقیت توصیف شده است. فواید سلامتی ماست ها به خوبی شناخته شده است و چندین محصول مبتنی بر ماست توسط مردم در سراسر جهان مصرف می شود (Behrad, 2018). (Shibiny *et al.*, 2018) و همکاران در سال ۲۰۰۹ به این نتیجه رسیدند که افزودن دارچین، تخمیر ماست را اصلاح نمی کند اما اجازه رشد گونه های لاکتوباسیلوس را در طول نگهداری در یخچال می دهد. دارچین-ماست حاوی باکتری های پروبیوتیک از رشد هلیکوباکتر پیلوری در شرایط آزمایشگاهی جلوگیری کرد (Behrad *et al.*, 2009). همچنین، Salihin و Bakrm در سال ۲۰۱۳ گزارش کردند که افزودن عصاره آب دارچین و سیر در شیر بز، گاو و شتر تأثیر مهمی بر اسیدی شدن از طریق تخمیر نداشت. علاوه بر این، حضور این دو گیاه در شیر باعث بهبود فعالیت پروتولیتیک کشت های مورد استفاده شد و بیشترین فعالیت پروتولیتیک در ماست شیر گاو بدست آمد. آب دارچین و سیر باعث رشد بهتر باکتری های اسید لاکتیک در این سه نوع

ماست از طریق شدند (Bakrm & Salihin, 2013). علاوه بر این، Helal و Tagliazucchi در سال ۲۰۱۸ دریافتند که افزودن پودر دارچین به ماست در مقایسه با ماست طبیعی، محتوای فنلی کل و فعالیت حذف رادیکالهای آزاد را افزایش می‌دهد. نشان داده شد که ۳۴/۷ درصد از کل ترکیبات فنلی موجود در عصاره آب دارچین در ماست غنی شده با دارچین ایجاد شده است که نشان می‌دهد ترکیبات باقی مانده به پروتئین‌های شیر متصل هستند. علاوه بر این، هضم آزمایشگاهی ماست غنی شده با دارچین منجر به آزاد شدن ترکیبات فنلی متقابل با پروتئین‌های شیر شد. ترکیبات بازیابی شده در ماست غنی شده با دارچین بیشتر از ترکیبات موجود در عصاره آب دارچین هضم شده بود. این نتایج نشان داد که ماتریس ماست دسترسی زیستی و ثبات دستگاه گوارشی پلی فنول‌های دارچین را بهبود می‌بخشد. ماست غنی شده با دارچین را می‌توان به عنوان منبع مهمی از پلی فنول‌های زیستی قابل دسترسی در نظر گرفت (Helal & Tagliazucchi, 2018).

Amirdivani و Baba در سال ۲۰۱۱ نشان دادند که عصاره‌های گیاهی، تخمیر باکتری‌های ماست شیر را بهبود می‌بخشند و اسیدی شدن ماست‌ها را افزایش می‌دهند. فعالیت پروتئولیتیک باکتری‌های ماست در طی تخمیر و نگهداری در یخچال در حضور نعناع فلفلی و سپس شوید و ریحان به حداکثر رسید. این ماست‌های گیاهی با محتوای بالای پیتیدهای فعال زیستی و فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی بهبود یافته مشخص می‌شوند که ممکن است طیف جدیدی از ماست‌ها را با خواص بالقوه سلامت چند منظوره به مصرف‌کنندگان ارائه دهد (Amirdivani & Baba, 2011). Hanifah و همکاران در سال ۲۰۱۶ *L. acidophilus* و عصاره رزل را در تولید ماست مبتنی بر شیر بز اضافه کردند. این ماست‌ها با افزایش فعالیت ضد میکروبی و گزینش‌پذیری گسترده برای باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی (باسیلوس سرئوس، اشریشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونلا تیفی)

مشخص می‌شوند که ممکن است به تولید ترکیبات ضد میکروبی بالاتر از جمله پیتیدهای ضد میکروبی و اسید آلی نسبت داده شوند (Hanifah et al., 2016). علاوه بر این، Liu در سال ۲۰۱۸ ثابت کرد که چای آجری فوژوان با ماست سازگار است و فعالیت‌های پروتئولیتیک و بتا-گالاکتوزیداز آن را افزایش می‌دهد. چای آجری فوژوان همچنین باعث کاهش سینریزس، بهبود ویسکوزیته و تعداد کل لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و استرپتوکوک ترموفیلوس شد. فعالیت آنتی‌اکسیدانی ماست آماده شده افزایش یافته و در یخچال نسبتاً پایدار است (Liu, 2018).

اثر شیر پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس حاوی عصاره مخلصه بر میزان کلسترول و تری‌گلیسرید سرمی موشهای صحرایی به این صورت بود که بیشترین تأثیر مخلصه بر روی کاهش کلسترول سرمی موشهای صحرایی مربوط به گروه شاهد بود (شاهد $<0.03/0.02/0.01$) و احتمالاً استفاده از شیر $0.01/0.02/0.03$ چربی باعث شده تا غلظت‌های $0.01/0.02/0.03$ مخلصه نسبت به گروه شاهد اثر کمتری داشته باشد. در مورد تأثیر مخلصه در کاهش تری‌گلیسرید سرمی موشهای صحرایی نتایج مختلفی دریافت شد که بیشترین تأثیر در کاهش تری‌گلیسرید مربوط به عصاره 0.01 مخلصه بود ($<0.03/0.02/0.01$ شاهد). اثر شیر پروبیوتیکی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم حاوی عصاره مخلصه بر میزان کلسترول و تری‌گلیسرید سرمی موشهای صحرایی به این صورت بود که بیشترین تأثیر عصاره مخلصه در شیر حاوی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در کاهش کلسترول مربوط به عصاره 0.01 مخلصه بود ($<0.03/0.02/0.01$ شاهد). تأثیر مخلصه در کاهش میزان تری‌گلیسرید در شیر حاوی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بسیار ناچیز بود تنها در گروه 0.03 مخلصه باعث کاهش ناچیز تری‌گلیسرید شد.

با مصرف محصولات پروبیوتیکی، اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه تولید می‌شود که سنتز کلسترول را در کبد متوقف و سبب حرکت کلسترول پلاسما به کبد می‌شود. همچنین بعضی

مخلصه با غلظتهای بالاتر و عدم بررسی و مقایسه با دیگر شیرها مانند شیر شتر، بز و غیره اشاره کرد. لذا پیشنهاد می گردد در مطالعات بعدی موارد فوق مد نظر قرار گیرد.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عصاره آبی گیاه مخلصه دارای اثر مثبت بر روی رشد باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدم در شیر و ماست پروبیوتیکی است. همچنین، شیر پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدم حاوی عصاره آبی مخلصه تاثیر مثبتی در کاهش کلسترول و تری گلیسرید در موشهای صحرایی دارد. بنابراین توصیه می گردد گیاه مخلصه بعنوان یک افزودنی مفید مورد توجه افراد جامعه و صنایع لبنی قرار گیرد.

تشکر و قدردانی

از کلیه افرادی که ما را در انجام این مطالعه یاری و حمایت نمودند تشکر و قدردانی می نمایم.

تعارض منافع

تعارض منافی بین نویسندگان وجود ندارد.

References

- Amirdivani S. and Baba AS. Changes in yoghurt fermentation characteristics, and antioxidant potential and in vitro inhibition of angiotensin-1 converting enzyme upon the inclusion of peppermint, dill and basil. *LWT-Food Sci Technol (Lebensmittel-Wissenschaft -Technol.)*, 2011; 44: 1458-1464.
- Ataei Jafari A., Hosseini S., Alavi Majd H. and Tahbaz F. Effects of milk replacement with regular yogurt and probiotic yogurt on blood lipid profiles of hypercholesterolemic and normocholesterolemic individuals.

- باکتریها از طریق ممانعت اتصال کلسترول به نمکهای صفاوی از جذب آن جلوگیری می کنند (Mortazavian & Sohrabvandi, 2006). در تحقیقی که بر روی عصاره سیر انجام گرفته بود، در شیر پروبیوتیکی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم نسبت به شیر پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس حاوی اسانس سیر در کاهش کلسترول سرمی موشهای صحرایی موثرتر بود و در شیر پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس نسبت به شیر بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در کاهش تری گلیسرید سرمی موشهای صحرایی موثرتر بود (Marhamatizadeh *et al*, 2012b). با مقایسه تحقیق های انجام شده بر روی عصاره مالت، سویا، عسل، آویشن، نعنا و سیر نشان داده شد که این ترکیبات باعث افزایش رشد باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در فرآورده های لبنی می شوند (Marhamatizadeh *et al.*, 2011a; Marhamatizadeh *et al.*, 2011b; Marhamatizadeh *et al.*, 2011c; Marhamatizadeh *et al.*, 2009; Marhamatizadeh *et al.*, 2010).

از محدودیتهای این مطالعه می توان به عدم بررسی گونه های دیگر باکتریهای پروبیوتیک، عدم بررسی عصاره آبی گیاه

Journal of Diabetes and Metabolic Disorders, 2008; 2 (23): 239-244.

Bakrm SA. and Salihin BA. Effects of inclusion of *Allium sativum* and *Cinnamomum verum* in milk on the growth and activity of lactic acid bacteria during yoghurt fermentation. *Amer-Euras J Agric Environ Sci*, 2013; 13: 1448-1457.

Behrad S., Yusof MY. and Goh K.L. Manipulation of probiotics fermentation

- of yoghurt by cinnamon and licorice: effects on yoghurt formation and inhibition of *Helicobacter pylori* growth in vitro. *Int Scholarly & Sci Res & Innovation*, 2009; 3: 563-567.
- Capasso F. The effect of an aqueous extract of *Tanacetum parthenium* L. on arachidonic acid metabolism by rat peritoneal leucocytes. *J Pharm Pharmacol*. 1986; 38(1): 71-2. doi: 10.1111/j.2042-7158.1986.tb04473.x.
- Ershidat OTM. and Mazahreh AS. Probiotics bacteria in fermented dairy products. *Pak J Nutr*, 2009; 8 (7): 1107-1113.
- Ferdowsifard M., Fazeli M., Samadi N. and Jamalifar H. The stability of fermented and Non-fermented probiotic milk produced by three species of Autochthonous *Lactobacillus*. *J Food Technol Nutr*, 2011; 8(4): 13-20.
- Hanifah R., Arief II. and Budiman C. Antimicrobial activity of goat milk yoghurt with addition of a probiotic *Lactobacillus acidophilus* IIA-2B4 and roselle (*Hibiscus sabdariffa* L) extract. *Int Food Res J*, 2016; 23(6): 2638-2645.
- Helal A. and Tagliazucchi D. Impact of in-vitro gastro-pancreatic digestion on polyphenols and cinnamaldehyde bioaccessibility and antioxidant activity in stirred cinnamon-fortified yoghurt. *LWT-Food Sci Technol (Lebensmittel-Wissenschaft-Technol.)*, 2018; 89: 164-170.
- Liu D. Effect of Fuzhuan brick-tea addition on the quality and antioxidant activity of skimmed set-type yoghurt. *Int J Dairy Technol*, 2018; 71: 22-33.
- Marhamatizadeh MH., Abbasi MA. and Rezazadeh S. Effect of powder thyme as the carrier of bacteria probiotic *Lactobacillus acidophilus* and *Bifidobacterium bifidum* in milk and yoghurt. *Journal of Microbial Biotechnology*, 2011a; 3(8): 1-6.
- Marhamatizadeh MH., Afrasiabi S., Rezazadeh S. and Marhamati Z. Effect of spearmint on the growth of *Lactobacillus acidophilus* and *Bifidobacterium bifidum* in probiotic milk and yogurt: *Afr J Food Sci*, 2011b; 5(13): 747-753.
- Marhamatizadeh MH., Karmand M., Farokhi AR., Rafatjoo R. and Rezazade S. The effects of malt extract on the increasing growth of probiotic bacteria *Lactobacillus acidophilus* and *Bifidobacterium bifidum* in probiotic milk and yoghurt. *J Food Technol Nutr*, 2011c; 8 (2): 78-84.
- Marhamatizadeh MH., Mohammadi M., Rezazadeh, S and Jafari F. Effects of garlic on the growth of *Lactobacillus acidophilus* and *Bifidobacterium bifidum* in probiotic milk and yoghurt. *Middle East JSci Res*, 2012a; 11 (7): 894-899.
- Marhamatizadeh MH., Rasekh I., Rezazadeh S. and Kazemi, MR. Study on honey yoghurt as the carrier of probiotic *Bifidobacterium bifidum*. *J Vet Pathol*, 2010; 1(2): 31-40.
- Marhamatizadeh MH., Shahriyarpour MS. and Rezazadeh S. Effect of chamomile essence on the growth of probiotic bacteria, *Bifidobacterium bifidum* and

- Lactobacillus acidophilus in milk and yoghurt: Global veterinaria, 2012b; 8(6): 605-611.
- Marhamatizadeh MH., Rafatjoo R., Farokhi AR, Karmand M. and Rezaazade S. The study of soya extract on the growth of probiotic Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium bifidum bacteria in probiotic milk and yoghurt. J Vet Pathol, 2009; 1(1): 23-28.
- Mortazavian AM. and Sohrabvandi S. Probiotics and food probiotic products; based on dairy probiotic products. Tehran: Eta Publication, 2006: PP: 18-372.
- Pareek A., Suthar M., Rathore GS. and Bansal V. Feverfew (Tanacetum parthenium L.): A systematic review. Pharmacogn Rev, 2011; 5(9): 103-10. doi: 10.4103/0973-7847.79105.
- Sadeghi E., Akhondzadeh Bassti A., Misaghi A., Zahraei Salehi T. and Bohlooli Esgoei, S. Evaluation of essential oil of cuminum cyminum and probiotic Lactobacillus acidophilus on the growth of S.aureus in Iranian white cheese. J Med Plant, 2010; 9 (2): 131-141.
- Standard Institute and Industrial Search of Iran. Milk and dairy: Finding acidity and pH-Test method. National industrial number 9985, 2006.



The Effect of Aqueous Extract of Feverfew Plant (*Tanacetum parthenium* L.) on the Growth of *Lactobacillus Acidophilus* and *Bifidobacterium Bifidum* in Probiotic Milk and Yogurt

Masoud Hosseini¹, Mohammad Hossein Marhamatizadeh^{1*}, Arash Payehdar²

¹Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran

²Department of Biology, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran

Received: 09/Jan/2022

Revised: 14/Feb/2022

Accepted: 17/Feb/2022

Abstract

Background and aim: Feverfew (*Tanacetum parthenium* L.) is a medicinal plant used in a wide range of diseases. However, the effect of this plant on the growth of probiotic bacteria has not been investigated yet. In this research, the possibility of producing food based on milk and probiotic yogurt with aqueous extract of feverfew plant was evaluated.

Material and Methods: In order to determine the effect of different doses of aqueous extract of feverfew plant on the growth of probiotic bacteria *Bifidobacterium bifidum* and *Lactobacillus acidophilus* in the first stage (milk) and in the second stage (yogurt), 0.33 grams of lyophilized bacteria *Bifidobacterium bifidum* and *Lactobacillus acidophilus* were added separately to one liter of sterilized low-fat milk. Acidity, pH and microbial growth during greenhouse storage and shelf life were investigated and sensory evaluation was performed at the seventh day after the production of the products. Also, at the end of the study, cholesterol and triglyceride levels of rats were measured.

Results: In the samples containing *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium bifidum* bacteria was observed that increasing the concentration of aqueous extract of feverfew plant gave a favorable taste to the yogurt, and in all the samples, the yogurt had a very good consistency, and the yogurt with 0.1% feverfew plant had the best taste. In the evaluation of microbial culture, *Bifidobacterium bifidum* probiotic bacteria did not grow well on MRS Agar medium compared to *Lactobacillus acidophilus*. By examining the results, it was found that increasing the concentration of aqueous extract of Feverfew plant had a positive effect on the growth of probiotic bacteria *Lactobacillus acidophilus* and *Bifidobacterium bifidum* in probiotic milk and yogurt. Further, in order to evaluate the effectiveness of *Bifidobacterium bifidum* and *Lactobacillus acidophilus* probiotic milk products with different concentrations of aqueous extract of feverfew plant on the cholesterol and triglyceride levels of rats, investigations and experimental tests were carried out that the probiotic milk containing *Lactobacillus acidophilus* and also the probiotic milk containing *Bifidobacterium bifidum* containing 0.1% aqueous extract of feverfew plant had the greatest effect in reducing cholesterol. *Lactobacillus acidophilus* milk containing 0.1% aqueous extract of feverfew and *Bifidobacterium bifidum* milk containing 0.3% extract of feverfew plant had the greatest effect in reducing triglycerides in rats.

Conclusion: Aqueous extract of feverfew plant has a positive effect on the growth of probiotic bacteria *Lactobacillus acidophilus* and *Bifidobacterium bifidum* in probiotic milk and yogurt. Also, *Lactobacillus acidophilus* and *Bifidobacterium bifidum* probiotic milk containing aqueous extract of feverfew has a positive effect on reducing cholesterol and triglyceride in rats.

Keyword: Aqueous extract of feverfew plant, *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium bifidum*, Triglyceride, Cholesterol, Probiotic

Cite this article as: Masoud Hosseini, Mohammad Hossein Merhamatizadeh, Arash Payehdar. The effect of aqueous extract of feverfew plant (*Tanacetum parthenium* L.) on the growth of *Lactobacillus Acidophilus* and *Bifidobacterium Bifidum* in probiotic milk and yogurt. J Altrn Vet Med. 2021; 4(11): 654-667.

* Corresponding Author

Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Kazerun Branch,
Islamic Azad University, Kazerun, Iran.

E-mail: drmarhamati@gmail.com, Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4751-7926>